

УТВЕРЖДЕНО  
Приказ Государственной ветеринарной и  
фитосанитарной службы Украины  
от 12.10.2011г. № 5  
регистрационное удостоверение  
№ ВВ-00354-02-11

Листок-вкладыш

**Название ветеринарного препарата:** Пробиотик ЭМПРОБИО®.

**Состав:** Пробиотик – это смесь культур, содержащий бактериальные клетки *Lactobacillus casei*, *Lactococcus lactis*, *Lactobacillus plantarum*, *Lactobacillus acidophilus*, *Saccharomyces cerevisiae* и продукты их метаболизма. Количество живых микробных клеток в 1см<sup>3</sup> пробиотика не менее – 10<sup>6</sup>-10<sup>8</sup>.

**Фармацевтическая форма:** Жидкость от светло- до темно-коричневого цвета с кефирно-силосным запахом. Возможно образование незначительного осадка, что не влияет на качество препарата.

**Иммунобиологические свойства:** Пробиотик ЭМПРОБИО® обладает антагонистическими свойствами против патогенных и условно-патогенных микроорганизмов, стимулирует выработку иммуноглобулина (Ig A) и др., образует биопленку.

**Вид животных для лечения и профилактики:** Все сельскохозяйственные и декоративные животные.

**Показания к применению:** Пробиотик применяют для профилактики и лечения желудочно-кишечных заболеваний домашних животных и птицы. Улучшает микрофлору кишечника. Оказывает гепатопротекторное, адсорбирующее и иммуностимулирующее действие. Создает благоприятные условия для пищеварения, улучшает конверсию корма.

**Противопоказания:** Не установлено.

**Меры предосторожности:** Пробиотик не подлежит применению в случае нарушения целостности флаконов, наличия посторонних примесей, плесени, хлопьев.

**Взаимодействие с другими средствами:** Применение пробиотика не исключает использование других средств лечения, используемых в ветеринарной медицине.

**Особые указания при беременности, лактации, яйценоскости:** Нет.

**ПРИМЕНЕНИЕ:** Применять в смеси кормом, питьевой **нехлорированной** водой или в чистом виде.

Продолжительность профилактического курса 12-14 дней.

При лечении заболеваний в составе комплексной терапии, доза увеличивается двукратно, продолжительность увеличивается на 3-7 дней (после выздоровления).

При переходе на другой тип питания, перевозках, переформировании животных показано использование препарата для адаптации пищеварения и компенсации стресса.

**Для профилактики заболеваний ЖКТ телят:** Новорожденным телятам за 30 мин. перед первой выпойкой молозива 20см<sup>3</sup> препарата добавить в 100см<sup>3</sup> кипяченой воды (однократно). Суточная доза рассчитывается из количества вскармливаемого молозива, при каждом вскармливании молозива нужно давать 20см<sup>3</sup> препарата. Выпаивать препарат до окончания молозиво-молочного периода (14д).

Молодняку в возрасте до 3 мес. в конце молозиво-молочного периода давать по следующей схеме: 20-30см<sup>3</sup> на голову/сутки.

Молодняку в возрасте от 3 мес. до 6 мес. – 30-50см<sup>3</sup> на голову/сутки.

**Для профилактики заболеваний ЖКТ поросят:** Новорожденным поросятам на искусственном вскармливании суточная доза рассчитывается по количеству кормлений – 1-2см<sup>3</sup> препарата на каждое вскармливание (14д). Поросятам в возрасте 14-28 дней – по 10-20см<sup>3</sup> на голову/сутки.

Поросятам на отъеме в возрасте 28-60 дней суточная доза составляет 20-30см<sup>3</sup> на голову/сутки.

Поросятам на доращивании в возрасте 60-90 дней суточная доза составляет 30-40см<sup>3</sup> на голову/сутки. Свиньям на откорме возрастом более 90 дней суточная доза составляет 40-60см<sup>3</sup> на голову/сутки.

**Для профилактики заболеваний ЖКТ ягнят и козлят:** Ягнята и козлята на искусственном вскармливании в возрасте с 1 по 10 день - 2-5см<sup>3</sup> на голову/сутки на каждое вскармливание с молоком, суточная доза рассчитывается по количеству кормлений. Ягнята и козлята в возрасте

10-14 дней – 5-6см<sup>3</sup> на голову/сутки. В возрасте 14 - 30 дней – 7-10см<sup>3</sup> на голову/сутки. В возрасте от 1 мес. до 4 мес. по 10 - 15см<sup>3</sup> на голову/сутки.

**Для профилактики заболеваний ЖКТ лошадей:** Новорожденным жеребят на искусственном вскармливании – 105см<sup>3</sup> разделить на количество вскармливаемого молозива, выпаивать препарат до окончания молозиво-молочного периода (14д). Жеребята на отъеме возрастом до 1,5 года – 150см<sup>3</sup> на голову/сутки. Для кобыл с жеребятами – 200см<sup>3</sup> на голову/сутки.

**Для профилактики заболеваний ЖКТ собак:** Комнатно-декоративных пород – 1-3см<sup>3</sup> на голову/сутки. Мелких пород (до 10кг) – 3-5см<sup>3</sup> на голову/сутки. Средних пород (10-30кг) – 9-12см<sup>3</sup> на голову/сутки. Крупных пород (свыше 30кг) – 15 - 20см<sup>3</sup> на голову/сутки.

**Для профилактики заболеваний ЖКТ кошек:** Мелких пород (до 4кг) – 1-2см<sup>3</sup> на голову/сутки. Средних пород (4-6кг) – 2-3см<sup>3</sup> на голову/сутки. Крупных пород (свыше 6кг) – 3-5см<sup>3</sup> на голову/сутки.

**Для профилактики заболеваний ЖКТ кроликов:** Взрослым – 3-4см<sup>3</sup> на голову/сутки. Молодняку – 1-1,5см<sup>3</sup> на голову/сутки. Сукрольным и лактирующим крольчихам – 6-8см<sup>3</sup> на голову/сутки.

**Для профилактики заболеваний ЖКТ кур яичных пород:** Взрослым несушкам – 1см<sup>3</sup> на голову/сутки. Молодняку возрастом 9-21 недель – 0,5см<sup>3</sup> на голову/сутки. Молодняку возрастом 1-8 недель – 0,3-0,5см<sup>3</sup> на голову/сутки.

**Для профилактики заболеваний ЖКТ кур мясных пород:** Взрослым – 1-1,5см<sup>3</sup> на голову/сутки. Молодняку в возрасте от 1 до 20 дней – 0,5см<sup>3</sup> на голову/сутки.

**Для профилактики заболеваний ЖКТ гусей:** Взрослым – 4-5см<sup>3</sup> на голову/сутки. Молодняку – 1,5-2см<sup>3</sup> на голову/сутки.

**Для профилактики заболеваний ЖКТ уток:** Взрослым птицам – 2-2,5см<sup>3</sup> на голову/сутки. Молодняку – 1-1,5см<sup>3</sup> на голову/сутки.

**Для профилактики заболеваний ЖКТ перепелов:** Взрослым перепелам – 0,1см<sup>3</sup> на голову/сутки. Молодняку – 0,01-0,05см<sup>3</sup> на голову/сутки.

**Побочные эффекты:** Не установлены.

**Период выведения (каренции):** 0 суток.

**Специальные предостережения для лиц и обслуживающего персонала, которые применяют ВИП:** Пробиотик дают с соблюдением общепринятых правил асептики, используют только стерильные материалы и инструменты.

**Особые меры безопасности при обращении с неиспользованным ВИП, способы его обезвреживания и утилизации:** Пробиотик во флаконах без этикеток, а также с поврежденной закупоркой не может быть применен. Подлежит уничтожению кипячением в течении 30 минут.

**Срок годности:** 12 месяцев. Использовать в течение 14 суток после открытия флакона хранить в холодильнике.

**Условия хранения и транспортировки:** Хранить в чистом, сухом, темном, защищенном от атмосферных осадков месте, при температуре от +4<sup>0</sup> С до +18<sup>0</sup> С.

**Упаковка:** полимерные флаконы емкостью 0,01дм<sup>3</sup>, 0,033дм<sup>3</sup>, 0,1дм<sup>3</sup>, 0,5дм<sup>3</sup>, 1дм<sup>3</sup>, 10дм<sup>3</sup>.

**Название и местонахождение владельца регистрационного удостоверения:** Разработчиком пробиотика ЭМПРОБИО® и нормативной документации является ООО «Пансионат «Орбита-2», Украина, г. Евпатория, ул. Красноярское шоссе, д.15. Эксклюзивное право продаж на территории Украины принадлежит ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ГЕОТЕК».

**Правила отпуска:** Без рецепта.

**Дополнительная информация:** Если препарат не отвечает требованиям листка-вкладыша или возникли осложнения, применение этой серии прекращают и сообщают в Государственный научно-контрольный институт биотехнологии и штаммов микроорганизмов (ГНКИБШМ) и поставщику (производителю). Одновременно с уведомлением, согласно "Инструкции о порядке предъявления рекламаций на биологические препараты, предназначенные для применения в ветеринарной медицине" от 03.06.98 № 2, в ГНКИБШМ направляют три нераскрытых флакона этой серии препарата по адресу 03151, г. Киев, ул. Донецкая, 30, ГНКИБШМ.

**Председатель Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины**  
**И.Ю. Бисюк**